

Cystoscopie

Een cystoscopie is een inwendig blaasonderzoek. Cystos betekent blaas, scopie betekent ergens in kijken. Dit onderzoek wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, de prostaat of de blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of ter controle na een operatie.

Vorbereiding voor het onderzoek

Voor een cystoscopie is geen speciale voorbereiding nodig. De uroloog wil voor het onderzoek weten of u in verwachting bent, of u overgevoelig voor geneesmiddelen bent, een hartklepaandoening heeft en of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld antibiotica.

Waar gebeurt het onderzoek?

De uroloog gebruikt hiervoor een kijkinstrument, dat verbonden is met een lichbron. Met deze zogenaamde cystoscoop bekijkt de uroloog het inwendige van uw plasbuis en blaas.

Op de cystoscopiekamer van de polikliniek urologie vindt het onderzoek plaats. De uroloog verricht het onderzoek geassisteerd door een verpleegkundige.

Wat gebeurt er?

U wordt gevraagd op de onderzoektafel te gaan liggen en uw benen te spreiden in beensteunen. De buitenkant van de geslachtsorganen worden met een desinfectie vloeistof gereinigd, waarna de plasbuis plaatselijk wordt verdoofd door een speciaal glijmiddel. Daarna schuift de uroloog het kijkinstrument via de plasbuis in uw blaas. Via het kijkinstrument laat de uroloog een steriele vloeistof in de blaas stromen. Hierdoor ontplooit de blaas zich zodat de uroloog de plasbuis en de blaas kan inspecteren.

Is het onderzoek pijnlijk?

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel als onaangenaam ervaren worden. U kunt dit verminderen, door u zo goed mogelijk te ontspannen en de aanwijzingen van de uroloog op te volgen. Omdat er tijdens het onderzoek steriele vloeistof in de blaas gebracht wordt, kunt u aandrang tot plassen krijgen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek zelf duurt 5 à 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Normaal gesproken zult u zich redelijk fit voelen, maar het is altijd prettig als er iemand met u mee komt en u thuis brengt. Na een cystoscopie treedt gewoonlijk gedurende enkele uren een wat branderig gevoel op bij het plassen en is er soms sprake van wat roze/rode urine. Door veel te drinken (2 tot 2½ liter per dag) kunt u dat verminderen.

Uitslag van het onderzoek

De uroloog vertelt u na het onderzoek de uitslag. Is er een stukje weefsel weggenomen of urine opgevangen voor laboratoriumonderzoek, dan hoort u de uitslag van de arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Complicaties?

Mogelijke complicaties zijn: bloedverlies via de urine, infectie en koorts. Wanneer het bloedverlies 3 à 4 dagen aanhoudt, of wanneer het bloedverlies toeneemt, neem dan contact op; ook bij andere klachten zoals veel pijn, koorts boven de 38.5° C of aanmerkelijk moeilijker plassen, neemt u contact met ons op. Overdag kan dit met polikliniek urologie en 's avonds en in het weekend met de spoedeisende hulp.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze telefoonnummers. U kunt ook onze website raadplegen.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie	020 - 634 6346
Urologie polikliniek	020 - 634 6243
Spoedeisende hulp	020 - 634 6200

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres	Postadres
Statenjachtstraat 1	Postbus 37610
1034 CS Amsterdam	1030 BD Amsterdam