

# Flecainide provocatietest

**Binnenkort wordt u verwacht voor een Flecainide provocatietest. In deze folder leest u wat er gebeurt voor, tijdens en na de test.**

## Wat is een Flecainide provocatietest?

Uw specialist heeft in het kader van uw cardiologisch onderzoek een Flecainide provocatietest voor u afgesproken. Tijdens dit onderzoek wordt het effect van dit medicijn op uw hart bestudeerd via het ECG (elektrocardiogram).

## Waarom een Flecainide provocatietest?

Flecainide (Tambocor®) is een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen. Flecainide vertraagt de elektrische geleiding in het hart. Hierdoor kunnen bepaalde zeldzame oorzaken van ritmestoornissen worden ontdekt, ook als deze op het 'normale' ECG niet zichtbaar zijn.

Omdat Flecainide de geleiding in het hart beïnvloedt, wordt dit middel onder ECG-controle op de hartbewaking toegediend. Op de polikliniek cardiologie is voor u een afspraak gemaakt voor een dagopname op de hartbewaking van het BovenIJ ziekenhuis.

## Vorbereiding

- Op de dag van opname bent u nuchter.
- U mag uw gewone ochtend medicatie innemen tenzij de cardioloog u anders voorschrijft.
- U kunt iemand meenemen naar het ziekenhuis. Echter vanaf een half uur vóór en tijdens het onderzoek mag er niemand bij u blijven.
- Neem iets mee voor tijdverdrijf na het onderzoek, u mag immers niet direct naar huis.
- Als u na het onderzoek het ziekenhuis weer mag verlaten, mag u zelf naar huis rijden.
- Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. U dient deze voor het betreden van de hartbewaking uit te schakelen.

## Wat kunt u verwachten?

- Op de afgesproken dag en tijdstip kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek cardiologie (route 10) van het BovenIJ ziekenhuis.
- Een poli medewerkster brengt u samen met uw papieren naar de hartbewaking.
- Op de hartbewaking sluit de verpleegkundige u aan op de monitor om uw hartritme te bewaken. Er wordt een infuus geprikt en u krijgt een automatische bloeddrukmeter om uw bovenarm.
- Tijdens het onderzoek wordt elke 2 minuten een ECG gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten.
- Het medicijn Flecainide loopt gedurende 10 minuten via het infuus in.
- Nadat alle Flecainide is toegediend, wordt na een kwartier én na een uur nog een ECG gemaakt.
- Indien er geen veranderingen op het ECG te zien zijn, mag u na overleg met cardioloog naar huis. Zijn er wel veranderingen zichtbaar dan kan verder observatie noodzakelijk zijn. De cardioloog zal dat aangeven en het beleid bepalen.

## Bijwerkingen van de Flecaïnide provocatietest

Tijdens de toediening van Flecaïnide kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken, dubbelzien, tremor, tintelingen en kan flushing optreden. Als gevolg van de toediening van Flecaïnide kunnen ook hartritmestoornissen optreden. De kans hierop is groter bij bepaalde erfelijke ritmestoornissen. Verdere toediening van Flecaïnide zal bij aanwijzingen voor het ontstaan van ritmestoornissen worden gestaakt. U zult in dit geval op de afdeling hartbewaking blijven totdat het ECG weer normaal is.

## De uitslag

De uitslag van de Flecaïnide provocatietest wordt direct na de test met u besproken.

## Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Cardiologie.

## Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact op met de polikliniek Cardiologie. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

## Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie	020 - 634 6346
Cardiologie polikliniek	020 - 634 6732
drs. Bakx, dr. Muilwijk, drs. V.d. Sandt, drs. Van de Wetering	

## Adres BovenIJ ziekenhuis

**Bezoekadres**  
Statenjachtstraat 1  
1034 CS Amsterdam

**Postadres**  
Postbus 37610  
1030 BD Amsterdam