


Malletvinger of hamervinger

U hebt een malletvinger of hamer vinger. U kunt dan het kootje aan de top van uw vinger niet strekken. Dit komt omdat de pees is afgescheurd of omdat een stukje bot met de pees is afgebroken.



De behandeling

Een malletvinger komt vaak voor. Een operatie is meestal niet nodig.

- **Tijdens kantoor tijd naar afdeling Spoeisende Hulp?**
 - Dan krijgt u in principe op de Gipskamer direct een speciaal op maat gemaakte spalk. Dit is om uw vinger recht te houden.
- **Buiten kantoor tijd naar afdeling Spoeisende Hulp?**
 - Dan krijgt u een tijdelijke spalk (zie foto)
 - U kunt direct een afspraak maken om naar de gipskamer te gaan tijdens kantoor uren maximaal 5 dagen na het bezoek aan de spoeisende hulp. U krijgt dan een op maat gemaakte spalk. U kunt zich melden bij de balie van de Gipskamer.



Een malletvinger kan wel of geen breuk hebben. De zorgverlener op de afdeling Spoeisende Hulp vertelt u wat u heeft en kruist het vakje aan bij de juiste tabel (zie hieronder).



Tijd	Behandeling bij een breuk
0-6 weken	Continue dragen spalk
6-8 weken	Start handtherapie (na advies therapeut starten met oefeningen) Spalk dragen in nacht en bij risicomomenten



Tijd	Behandeling zonder een breuk (scheur van de pees)
0-8 weken	Continue dragen spalk
8-10 weken	Start handtherapie (na advies therapeut starten met oefeningen) Spalk dragen in nacht en bij risicomomenten

Instructies

Het is van belang de volgende instructies op te volgen voor een optimale genezing.

- **U moet de spalk continu (24 uur per dag) dragen, non-stop.**
- **Als u de spalk toch af doet en de vinger buigt, moet de genezing weer opnieuw beginnen. U begint dan weer van voren af aan met het tellen van de weken. De kans op volledige genezing is dan kleiner!**
 - Hebt u een afgescheurde pees? Dan moet u de spalk 8 weken dragen.
 - Hebt u een breuk? Dan moet u de spalk 6 weken dragen.

- Hierna moet u de spalk nog 2 weken in de nacht dragen. Op advies van de handtherapeut moet u de spalk soms langer dragen.
- Draag de spalk ook overdag bij activiteiten waarbij de vinger het risico loopt om geblesseerd te raken.
- De vinger en spalk mogen niet nat worden. Dit is om irritatie en verweking van de huid te voorkomen.
- Probeer het wassen van de vinger te minimaliseren aangezien de kans aanwezig is dat de vinger dan buigt. Wilt u de vinger toch wassen of de nagels knippen? Zorg er dan voor dat de vinger volledig gestrekt blijft. U kunt dit doen door de vinger in gestrekte stand op tafel te zetten zodat deze niet per ongeluk kan buigen.
- Hebt u pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat u te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in. U kunt maximaal 4x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol innemen op vaste tijden.

Herstel

- U krijgt van de arts of op de Gipskamer een verwijzing voor een handtherapeut. U kunt een afspraak maken met de handtherapeut na 6 weken bij een afgebroken stukje bot aan de pees, of na 8 weken bij een afgescheurde pees. De handtherapeut beoordeelt wanneer u kunt beginnen met oefenen. U krijgt instructies over het oefenen van de vinger en het gebruik in het dagelijks leven. Let hierbij op dat u de oefeningen langzaam opbouwt en geen plotselinge knijp bewegingen maakt. Als u dit wel doet, kan de pees opnieuw beschadigen.
- Meestal is de vinger na 3 maanden weer volledig belastbaar.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de 'Breuklijn', telefoonnummer 020 – 634 6194. Bereikbaar ma – vr 10.00-12.00 en 13.00-16.00. Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op onze website bij 'Kosten en verzekering'.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Breuklijn Bereikbaar: ma – vr 10.00-12.00 13.00-16.00 020 – 634 6194

Spoedeisende hulp 020 – 634 6200

Ontevreden?

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres

Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres

Postbus 37610
1030 BD Amsterdam