

Sedatie met Propofol

(lichte) slaap bij onderzoek of behandeling

Binnenkort komt u naar het BovenIJ ziekenhuis voor een onderzoek of een behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek een sedatie krijgt met het medicijn Propofol. U wordt dan in slaap gebracht. Waarom is dit nodig? Hoe krijgt u het medicijn toegediend en zijn er bijwerkingen? Dit en meer leest u in deze folder.

Belangrijk

Vul de bijgevoegde vragenlijst 'Sedatie met Propofol' zo volledig mogelijk in. Neem deze ingevulde vragenlijst samen met uw actueel medicatie overzicht (AMO) mee naar het ziekenhuis op de dag van het onderzoek.

Gesprek met Sedatie Praktijk Specialist

Op de dag van het onderzoek heeft u een voorbereidingsgesprek met de sedatie praktijk specialist. Die vertelt u meer over de sedatie. U kunt alleen sedatie krijgen als u eerst een gesprek heeft gehad. In overleg met uw arts gaat u bij bepaalde onderzoeken of ingrepen van tevoren naar de polikliniek anesthesiologie/sedatie voor extra onderzoek.

Waarom een (lichte) slaap?

Door sedatie heeft u tijdens het onderzoek minder last van spanning. Het middel Propofol werkt snel en is ook snel uitgewerkt. U voelt zich rustiger en ervaart minder ongemak van het onderzoek. U slaapt meestal tijdens het hele onderzoek of behandeling. Sommige patiënten worden tussendoor een beetje wakker, maar u heeft dan geen pijn. Meestal bent u na een half uur weer goed wakker.

Uw voorbereiding thuis

- Gebruikt u medicijnen? U moet deze gewoon innemen, behalve als het anders is afgesproken met uw behandelend arts, de anesthesioloog of de sedatie praktijk specialist.
- U dient uw horloge en sieraden (ook piercings) af te doen. Neem geen waardevolle spullen mee. Uw gehoorapparaat kunt u zo lang mogelijk in houden.
- Verwijder eventuele make-up en nagellak. De sedatie praktijk specialist wil de natuurlijke kleur van uw huid en nagels zien.

De sedatie kan alleen doorgaan als:

- u eerst een voorbereidingsgesprek met een sedatie praktijk specialist heeft gehad.
- u na het onderzoek onder begeleiding naar huis gaat. Zorg daarom dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis. Of regel dat we iemand kunnen bellen om u na het onderzoek te komen ophalen.
- u niet gegeten of gedronken heeft. U moet nuchter zijn.

Eten en drinken voor een sedatie

Tijdens de sedatie moet u een lege maag hebben. U mag dus niet eten en drinken voor de sedatie. U moet nuchter zijn.

Bij een volle maag kan tijdens de sedatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomen. Voor uw eigen veiligheid moet u zich houden aan de regels uit het schema 'Eten en drinken voor een sedatie'. Als u gegeten of gedronken heeft en dus geen lege maag heeft voor de sedatie, kan de sedatie niet doorgaan. U bent dan niet nuchter.

Tanden poetsen mag wel. Ook uw medicijnen kunt u eventueel innemen met een slokje water (tot 1 uur voor de sedatie).

Regels 'eten en drinken voor een sedatie'

	Eten 	Drinken 
Tot middernacht (00.00 uur)	Alles	Alles
Vanaf middernacht tot 2 uur voor de opname	Niets	Alleen water, aanmaaklimonade, thee of zwarte koffie (zonder melk of melkpoeder)
Vanaf 2 uur voor de opname	Niets	Niets

Let op! Geef het aan als u kort voor de sedatie toch gegeten of gedronken heeft. Het kan zijn dat voor uw eigen veiligheid de sedatie dan niet doorgaat.

Voor het onderzoek ontvangt een verpleegkundige van de afdeling of de sedatie praktijk specialist u. De verpleegkundige stelt u vragen, controleert uw bloeddruk en pols. U krijgt ter voorbereiding op de sedatie een infuusnaald in uw arm.

Wat gebeurt er tijdens de sedatie en het onderzoek?

Op de behandelkamer komt u op een speciaal bed te liggen. U wordt aangesloten aan de monitor. Uw bloeddruk, hartslag en de zuurstofverzadiging in uw bloed worden voortdurend gemeten.

- U krijgt een slangetje met zuurstof in uw neus. Hiermee wordt ook de ademhaling gecontroleerd.
- Via het infuus krijgt u het slaapmiddel en soms ook een pijnstiller toegediend.
- Hierdoor voelt u zich al snel ontspannen of slaperig. Als de sedatie goed ingewerkt is, kan het onderzoek beginnen.
- De sedatie is afgestemd op de duur van het onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond, maken wij u wakker.

Na het onderzoek

Na het onderzoek of de behandeling brengen we u naar de uitslaapruijnte. U blijft minimaal 1 uur onder controle. Als u goed wakker bent, verwijderen we het infuus. U kunt iets te drinken en te eten krijgen.

Door de sedatie herinneren de meeste mensen zich weinig tot niets van het onderzoek. Neem deze dag geen belangrijke beslissingen, omdat u vergeetachtig kunt zijn.

Heeft u nog een gesprek met uw arts dan raden wij u aan om uw begeleider hierbij aanwezig te laten zijn.

U mag tot 12 uur na toediening van de verdoving niet deelnemen aan het verkeer, niet werken en geen alcohol drinken. U kunt niet alleen reizen, maar moet onder begeleiding naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. U krijgt of heeft hiervoor een (bel)afpraak.

Bijwerkingen

Het slaapmiddel werkt enkele uren kalmerend, verslapt de aandacht en kan de spierfunctie verminderen. Andere bijwerkingen:

- Soms sufheid tot enkele uren na de verdoving of behandeling.
- Soms misselijkheid. Als het nodig is, krijgt u een medicijn.
- Soms problemen met de ademhaling of de hartfunctie tijdens het onderzoek of behandeling. Dit komt echter zelden voor. Deze klachten zijn goed te behandelen met medicijnen.

Uitstel onderzoek of behandeling onder sedatie

Houd er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat door onvoorziene omstandigheden de sedatie, een onderzoek of een behandeling uitgesteld kan worden. U krijgt bij uitstel zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, schrijft u deze dan op. U kunt ze voor het onderzoek of behandeling stellen aan de sedatie praktijk specialist.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze telefoonnummers. U kunt ook onze website raadplegen.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie	020 - 634 6346
Sedatie polikliniek	020 - 634 6287
Anesthesiologie polikliniek	020 - 634 6287
Spoedeisende hulp	020 - 634 6200

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres	Postadres
Statenjachtstraat 1	Postbus 37610
1034 CS Amsterdam	1030 BD Amsterdam