

INFORMATIE OVER

SP-katheter plaatsen

Uw arts heeft voorgesteld om een suprapubische (sp) katheter in te brengen. Een katheter is een dun slangetje dat ervoor zorgt dat de urine continu uit de blaas loopt. In deze folder leest u over wat u kunt verwachten voor, tijdens en na het onderzoek.

Uw afspraak

Op de afgesproken datum meldt u zich bij de balie van de polikliniek urologie. Wij verzoeken u vriendelijk om tien minuten voor aanvang van de ingreep aanwezig te zijn.

Vorbereiding

- Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn.
- Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Dan moet u deze medicatie, in overleg met uw behandelend arts, enige dagen van tevoren te stoppen.
- Als u overgevoelig bent voor jodium meld dit dan aan uw behandelend arts en verpleegkundige.
- Indien nodig wordt voor de ingreep de buikwand geschoren.

De ingreep

- De ingreep gebeurt meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving. Zo nodig brengen we een blaaskatheter in via de plasbuis om de blaas te kunnen vullen, zodat hij beter aan te prikken is.
- Na desinfectie met jodium verdooft de arts de buikwandhuid met een injectie.
- Vervolgens maakt de arts op de plaats van de verdoofde huid een gaatje.
- Hierna prikt hij met een naald voorzien van een holle buis (de trocar) de blaas aan.
- Hij verwijdt de naald, de trocar blijft achter, en plaatst de suprapubische katheter (een dun slangetje) rechtstreeks in de blaas.
- Daarna verwijdt de arts de trocar en wordt de ballon van de katheter opgeblazen om te voorkomen dat de katheter uit de blaas raakt.

- De urine wordt opgevangen in een zakje.
- Tijdens de ingreep wordt de blaas in beeld gebracht door echografie.
- Na het plaatsen van de suprapubische katheter verwijdert de arts de blaaskatheter.
- Het wondje bij de suprapubische katheter bedekken we met een steriel gaasje.
- De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Naar huis

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. We adviseren u om iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen. U krijgt een pakket mee naar huis met verzorgings- en opvangmateriaal en instructies voor gebruik van de sp-katheter.

Verwisselen van de katheter

De verwisseling van de katheter gebeurt om de zes weken. Hiervoor krijgt u steeds een nieuwe afspraak op de polikliniek. Meteen nadat de oude katheter is verwijderd, moet de nieuwe worden ingebracht omdat het insteekkanaal vrij snel dicht kan groeien.

Complicaties

Mogelijke complicaties zijn blaasbloedingen of het aanprikken van de darmen. Als de katheter uit de buik valt, moet u direct contact opnemen met de polikliniek urologie of de verpleegafdeling urologie (3e etage).

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op. U kunt ook onze website raadplegen.

Afdelingen

Urologie polikliniek

Telefoonnummer	020-634 6243
Route	33



<https://www.bovenij.nl/aandoening-behandeling/sp-katheter-plaatsen/sp-katheter-plaatsen>
Deze download is gemaakt op 28-07-2026 om 08.20 uur.