



INFORMATIE OVER

Behandeling met galantamine

Uw arts heeft galantamine voorgeschreven. In deze folder vindt u informatie over dit medicijn.

Wat is galantamine?

Galantamine is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij bepaalde vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Het is ook wel bekend onder de merknaam ReminylL.

Galantamine kan dementie niet genezen en ook niet het ziekteproces vertragen. Wel kan het symptomen zoals geheugenverlies en verwardheid verminderen. Met dit medicijn willen we ervoor zorgen dat u uw dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk kunt blijven doen.

Galantamine werkt niet bij iedereen. We kunnen pas zien of het bij u werkt, als u het medicijn gaat gebruiken.

Hoe werkt galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar praten in contact staan. Hiervoor zijn 'boodschapperstoffen' nodig, die neurotransmitters worden genoemd. Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Zoals denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Men denkt dat de klachten bij dementie komen door een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou zo uw functioneren kunnen verbeteren.

Hoe gebruikt u galantamine?

U neemt één keer per dag een galantaminecapsule in met water of een andere vloeistof. Het beste is om dit bij het ontbijt te doen, halverwege de maaltijd. Eet eerst iets, neem dan de pil in en eet dan weer iets.

Slik de pil in een keer door. Kauw of breek de capsule niet. Vanwege de werking en mogelijke bijwerkingen is kunt u beter geen galantamine innemen als u alleen bent. Het is beter als er iemand bij u is. Dit kan een familielid zijn of iemand van de thuiszorg. Meestal

wordt onderstaand doseringsschema gebruikt:

- Week 1 t/m 4: een keer per dag 1 capsule van 8 mg
- Week 5 t/m 8: een keer per dag 1 capsule van 16 mg
- Vanaf week 9: een keer per dag 1 capsule van 24 mg

Let op! Uw arts kan voor een ander schemakiezen. Volg altijd het advies van uw arts op.

Bijwerkingen

Zoals bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van galantamine. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Misselijkheid
- Braken en soms diarree
- Hoofdpijn

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan is dit meestal:

- Bij het starten van de behandeling
- Als de dosering wordt opgehoogd
- Als galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen

Als u een teveel neemt (bijvoorbeeld dubbel, omdat u bent vergeten dat u er al eentje hebt genomen)

Heeft u bijwerkingen? Meld dit dan bij uw behandelend arts. Hij/zij kan dan bepalen of de dosering (tijdelijk) moet worden aangepast. Pas de dosis niet zelf aan. Drink gedurende de dag voldoende water (minimaal 8 glazen) om bijwerkingen te voorkomen. De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen. De arts kan tijdelijk een middel tegen misselijkheid geven. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, neem dan contact opnemen met uw behandelend arts.

Vragen

Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige via de polikliniek Geriatrie.

Afdelingen

Geriatricie polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6253

Route 2e etage - zuid



<https://www.bovenij.nl/aandoening-behandeling/galantamine/behandeling-met-galantamine>
Deze download is gemaakt op 02-08-2026 om 03.11 uur.