



INFORMATIE OVER

ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio en Pancreaticografie) bij het OLVG

U krijgt binnenkort een ERCP in het OLVG. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. Een ERCP is een inwendig onderzoek. De arts kijkt daarbij naar de galwegen en naar de afvoergang van de alvleesklier. Zo kan de arts zien of er iets niet in orde is. Het onderzoek helpt om te vinden waarom u klachten heeft. Soms kan de arts tijdens het onderzoek ook meteen een probleem behandelen.

Wat is een ERCP?

ERCP betekent Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie. Bij dit onderzoek bekijkt de arts de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier. Hiervoor gebruikt de arts röntgenfoto's en contrastvloeistof. Het onderzoek gebeurt met een endoscoop. Dat is een lange, dunne, buigzame slang met een kleine videocamera. De arts brengt de endoscoop via uw mond, slokdarm en maag naar de twaalfvingerige darm.

Tijdens het onderzoek wordt u in een diepe slaap gebracht. Dit wordt ook wel diepe sedatie genoemd. Via [deze link](#) krijgt u meer informatie over de sedatie.

Uw afspraak bij het OLVG

Heeft u een afspraak bij OLVG Locatie Oost? Meldt u zich dan bij de Endoscopie- en Behandelafdeling.

Heeft u een afspraak bij OLVG Locatie West? Meldt u zich dan bij de afdeling Endoscopie.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is een goede voorbereiding nodig. Hieronder staan de instructies. Als u zich hier niet aan houdt, kan het onderzoek niet doorgaan.

U moet voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u voor het onderzoek vanaf 0.00 uur niet mag eten en drinken. Dit is ook van belang voor het slaapmiddel dat u krijgt.

Medicijnen

- Op de dag van het onderzoek mag u uw medicijnen innemen met een slokje water. Stop nooit zelf met uw medicijnen, overleg altijd eerst met uw arts.
- Gebruikt u medicijnen, vooral bloedverdunners? Bespreek dan ruim van tevoren met uw arts of u deze moet blijven gebruiken.
- Gebruikt u insuline? Neem dan uw bloedsuikermeter en insuline mee naar het ziekenhuis.
- Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (deze kunt u gratis via uw apotheek krijgen)

Overige aandachtspunten

- Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Meld dit dan aan de arts.
- Heeft u een pacemaker of defibrillator? Neem dan uw pas met het serienummer mee.
- Draag het liefst makkelijk zittende kleding. Draag geen beha met beugel of bovenkleding met rits, omdat dit het röntgenbeeld kan verstoren.

Het onderzoek

- Een ERCP wordt gedaan door een maag-darm-leverarts. Een endoscopieverpleegkundige assisteert hierbij. Er is ook een medewerker van de narcose aanwezig.
- Via een infuus in uw arm krijgt u een slaapmiddel.
- Als u slaapt, krijgt u een zetpil om de alvleesklier te beschermen.
- Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik of op uw linkerzijde, met uw linkerarm achter uw rug. Zo kan de arts makkelijker werken.
- Tussen uw tanden plaatsen we een plastic ring. Dit beschermt uw tanden en de endoscoop.
- De arts schuift de endoscoop via uw mond naar de twaalfvingerige darm. Op die plek komen de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier in de darm uit.
- Via de endoscoop spuiten we contrastvloeistof in de galwegen en/of in de afvoergang van de alvleesklier. Daardoor kan de arts de inwendige organen beter beoordelen op de röntgenfoto.
- Soms kan de arts meteen een behandeling doen. Bijvoorbeeld galstenen verwijderen of een kunststof of metalen buisje plaatsen om een vernauwing in de galwegen te openen.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapruijnte van het OLVG gebracht.

- Het kan zijn dat u nog een opgeblazen gevoel heeft. Door winden en boeren te laten verdwijnt dit.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt 30 tot 60 minuten, hierna blijft u ongeveer een uur uitslapen.

De uitslag

Na het onderzoek krijgt u de uitslag. Soms is dit een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag krijgt u dan binnen 2 weken van uw behandelend arts op de polikliniek van het OLVG. Als er weefsel wordt onderzocht, is de uitslag meestal na ongeveer 7 werkdagen bekend.

Kans op complicaties

De arts die u heeft doorverwezen, bespreekt vóór het onderzoek welke problemen kunnen ontstaan. Dit heten complicaties. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld een klein gaatje in de maag of darm zijn, of een bloeding of ontsteking. Als er tijdens het onderzoek meer handelingen nodig zijn, is de kans op complicaties groter.

Naar huis

- Na sedatie met Propofol mag u, na ongeveer één uur op de uitslaapkamer, met begeleiding naar huis. Sedatie betekent dat u slaperig of bijna in slaap bent tijdens het onderzoek.
- U mag weer gewoon eten en drinken.

Heeft u na thuiskomst ernstige klachten, zoals hevige buikpijn, bloedverlies of koorts boven 38,5 °C? Neem dan tussen 8.15 en 16.15 uur contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling (020 510 87 77). Buiten deze uren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (020 599 30 16).

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? U kunt het OLVG bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact met uw zorgverzekeraar of kijk op <https://www.olvg.nl/uw-bezoek-aan-olvg/vergoeding-kosten-behandeling/>

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl, maar u kunt het OLVG natuurlijk ook bellen.

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

Telefoonnummer: 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

Telefoonnummer: 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)

Afdelingen

Endoscopie Centrum

Telefoonnummer	020-634 6185
Openings- en bezoektijden	Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Route	2e etage

Maag-, darm- en leverziekten (MDL) polikliniek

Telefoonnummer	020-634 6185
Openings- en bezoektijden	Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur
Route	2e etage west



<https://www.bovenij.nl/ercp-endoscopische-retrograde-cholangio-en-pancreaticografie-bij-het-olvg>
Deze download is gemaakt op 30-07-2026 om 19.18 uur.