

 I N F O R M A T I E O V E R

Plexus coeliacus blokkade

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik dat een rol speelt bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk.

Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuwnetwerk gespoten, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken. De motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed door deze behandeling. Alleen de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.

Voorbereiding

- U wordt of bent al opgenomen op de verpleegafdeling. De opname voor een plexus coeliacusblokkade duurt meestal 2 of 3 dagen.
- Voor de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken.
- Geef eventuele allergieën door aan de arts
- Omdat de behandelkamer steriel is, is het nodig dat u zo kort mogelijk voor de behandeling een bad of douche neemt.

Stoppen met bloedverdunner of antistollingsmiddel

- Gebruikt u een bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal) wordt deze in overleg voor de behandeling gestopt. Overleg hierover met de arts die de bloedverdunner heeft voorgeschreven.
- Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) dan is het noodzakelijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de trombosedienst zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de INR-waarde op de dag van de behandeling 1.6 of lager is.

Behandeling

Voor de behandeling krijgt u een infuus. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U krijgt twee prikken in uw rug aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de navel. De arts zoekt onder röntgendoorlichting met twee naalden naar de juiste plek. Hij spuit dan de behandelvloeistof in rondom de zenuwnetwerk. De behandeling kan in principe onder een lokale verdoving plaatsvinden. Als het liggen op de buik voor u een te grote belasting is of teveel pijn doet kan in overleg worden gekeken of de behandeling onder narcose mogelijk is. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Het resultaat van de behandeling wordt na 1 á 2 dagen duidelijk. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en complicaties

- Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, daarom krijgt u een infuus met vocht.
- Tijdelijk kan diarree tijdelijk optreden. Dat is normaal.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze telefoonnummers. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. U kunt ook onze website raadplegen.

Afdelingen

Pijnbestrijding polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6287

Route 32



<https://www.bovenij.nl/aandoening-behandeling/plexus-coeliacus-blokkade>
Deze download is gemaakt op 27-07-2026 om 22.21 uur.