




Lactose Tolerantie Test (LTT)



Klinisch Chemisch Laboratorium



Op verzoek van uw arts wordt bij u een lactose tolerantietest (LTT) uitgevoerd. Met deze test kan worden vastgesteld of enzymen, die in de dunne darm aanwezig zijn, lactose kunnen omzetten in onder andere glucose.

Vorbereiding

Voorafgaande aan de LTT wordt eerst een glucose tolerantietest (GTT) uitgevoerd. U krijgt voor deze test een aparte patiënteninformatiefolder.

Op de dag van de LTT moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u vanaf de vorige avond 22.00 uur niet meer mag roken, eten of drinken (behalve wat water).

De ochtend van de test wordt u om 08.00 uur verwacht op het poliklinisch afname laboratorium.

De test

- Een medewerker van het afname laboratorium neemt bij u bloed af uit een vinger.
- Hierna krijgt u een lactosehoudend drankje te drinken. Dit dient u in ongeveer 5 minuten op te drinken. Het is mogelijk dat u enige darmklachten krijgt gedurende de test.
- Na inname van het drankje wordt na 30, 60, 90 en 120 minuten bloed afgenomen uit een vinger.
- Tijdens de test moet u in het ziekenhuis blijven, zich niet inspannen, niet roken of eten en mag u beperkt water drinken.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar de receptie van het afnamelaboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie 020 - 634 6346

Afnamelaboratorium 020 - 634 6301

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres

Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres

Postbus 37610
1030 BD Amsterdam



BovenIJ ziekenhuis Amsterdam
www.bovenij.nl